



Rokycanská
nemocnice

Nemocnice
Plzeňského
kraje

POUČENÍ DÁRCE KRVE

Doporučení výboru Společnosti pro transfuzní lékařství ČLS JEP č. STL_01, verze 5 (2019_06)

Seznámení se s textem stvrzuje dárce svým podpisem v dotazníku

I. PRÁVA DÁRCE

Dárce má právo:

- ✓ kdykoliv změnit své rozhodnutí o darování krve a odstoupit od odběru
- ✓ klášť dotazy ohledně dárcovství krve a okolností odběru
- ✓ na informace o významu dobrovolného a neplaceného dárcovství
- ✓ na podrobné vysvětlení metody a typu odběru krve a/nebo jejích složek včetně možných rizik spojených s odběrem
- ✓ na podrobné vysvětlení důvodů, které brání darování krve či krevní složky pro možné ohrožení zdravotního stavu dárce nebo možné ohrožení zdraví příjemce transfuzního přípravku z nich vyrobeného
- ✓ vědět o způsobech předodběrového vyšetření (laboratorního a klinického) a o povinných vyšetřeních, kterým je podrobena darovaná krev
- ✓ vědět, jaké jsou možnosti dalšího zpracování a využití krve a krevních složek
- ✓ na informaci o tom, že odebraná krev a její složky budou použity uvedeným způsobem, jen pokud splní kritéria bezpečnosti a jakosti
- ✓ na informace o svém zdravotním stavu a výsledku povinných laboratorních vyšetření
- ✓ na soukromí během klinického vyšetření a při pohovoru s lékařem či jiným pověřeným pracovníkem
- ✓ na ochranu před zneužitím jakýchkoliv informací týkajících se darování jeho krve a jeho zdravotního stavu
- ✓ na informaci o uchovávání osobních dat a dalších údajů o zdravotním stavu a o jejich ochraně před zneužitím dle platných zákonů

Zařízení transfuzní služby má konečnou odpovědnost za jakost a bezpečnost odebírané krve a krevních složek, proto má právo definitivně rozhodnout o přijetí či vyřazení dárce.

Právo příjemců transfuze na ochranu jejich zdraví převažuje nad jakýmkoli jinými skutečnostmi, včetně přání jednotlivců darovat krev⁶.

II. RIZIKO PRO DÁRCE KRVE

ODBĚR KRVE ČI KREVNÍCH SLOŽEK NE ZCELA ZDRAVÉMU DÁRCI

Odběr krve či krevních složek může poškodit ne zcela zdravého dárce, proto provádíme základní vyšetření, která slouží ke všeobecnému posouzení zdravotního stavu dárce.

Všechny abnormální nálezy jsou dárci oznámeny. Za dočasné nebo trvalé vyřazení z dárcovství odpovídá lékař transfuzního zařízení. O důvodech dočasného nebo trvalého vyřazení z dárcovství je dárce informován.

NEŽÁDOUCÍ REAKCE NA ODBĚR

Jako nežádoucí reakce na odběr (komplikace) se může objevit:

- ✓ krevní výron, modřina (špatný vpich, krvácení do podkoží po vpichu). Riziko této komplikace lze snížit řádným stlačením místa vpichu po odběru,
- ✓ celková reakce, mdloby, které jsou způsobeny ne dost rychlým přizpůsobením krevního oběhu změnám při odběru, nebo nepřiměřenou psychickou reakcí. Ke mdlobě dochází nejčastěji u dárců hladovějících, unavených a při příliš rychlém opuštění odběrového křesla,
- ✓ u přístrojových odběrů (kde je krev mimotělně míšena s protisrážlivým roztokem) může dojít vlivem kolísání hladiny vápníku k drobným svalovým záškubům (obvykle trnutí jazyka, mravenčení rtů apod.). Pokud by nebyl vápník podán nebo rychlosť odběru upravena, mohlo by dojít i k větším křečím. Důležité je, aby dárce byl řádně poučen a hlásil již první příznaky (zcela výjimečně by mohlo dojít k podobným komplikacím i z jiných příčin, zásady jejich prevence i průběh jsou obdobné).

Nežádoucí reakce na odběr se může objevit až po opuštění zařízení transfuzní služby. Pokud taková situace nastane, informujte, prosíme, pracovníky transfuzního oddělení nebo odběrového střediska.

**Všechn materiál používaný k vlastnímu odběru krve, krevních složek i k odběru krve
k laboratornímu vyšetření je zásadně k jednorázovému použití.**

ŽÁDNÉ RIZIKO PŘENOSU JAKÉKOLI KRVÍ PŘENOSNÉ INFEKCE NA DÁRCE NEHROZÍ!

III. OHROŽENÍ PŘÍJEMCE KREVNÍ TRANSFUZE

Léčba krví a krevními složkami přináší příjemci transfuze riziko přenosu infekční choroby od dárce krve. Krví přenosných infekcí je celá řada, z praktického hlediska jsou však nejvýznamnější infekční žloutenka typu B, infekční žloutenka typu C a AIDS.

výběrem vhodného dárce krve ← Riziko přenosu infekce se snažíme snížit → vyšetřením odebrané krve

VÝBĚR DÁRCE

Příklady rizika výskytu nemoci přenosné krví (dárce se vyřazuje trvale nebo dočasně po ukončení dané aktivity nebo zákuoru)

Vyřazení na 6 měsíců

- ✓ rizikové sexuální chování, zejména:
 - pohlavní styk mezi muži (platí i pro sexuální partnerku tohoto muže)
 - pohlavní styk s osobou infikovanou HIV nebo nemocnou AIDS
 - střídání náhodných sexuálních partnerů, skupinový sex
 - pohlavní styk s osobou, která užívá injekční drogy
 - pohlavní styk s osobou provozující prostitutci
 - pohlavní styk provozovaný pro peníze nebo drogy (prostituce)
- ✓ úzký kontakt s nemocným s infekční žloutenkou (společná domácnost, sexuální kontakt)
- ✓ tetování, propichování uší, body piercing, akupunktura apod.
- ✓ potřísnění sliznice nebo poraněné kůže infekčním materiélem
- ✓ endoskopické vyšetření (např. kloubů – artroskopie, žaludku - gastroskopie, střev - kolonoskopie, močových cest – cystoskopie, dýchacích cest – bronchoskopie)
- ✓ operace
- ✓ transfuze (podání transfuzního přípravku) v ČR, v zahraničí po roce 1996
- ✓ transplantace s použitím tkáně nebo buněk lidského původu
- ✓ pobyt v nápravném zařízení (vězení)

Vyřazení na 12 měsíců

- ✓ léčba nebo sledování pro pohlavní chorobu /syfilis, kapavka/
- ✓ toxikomanie a alkoholismus – po vyléčení

Trvalé vyřazení

- ✓ v případě rodinného rizika Creutzfeldt-Jakobovy nemoci a rizika jejích variant (vCJD = BSE, TSE)
- ✓ pobyt ve Velké Británii a Francii nad 12 měsíců v letech 1980-1996 (teoretické riziko variantní Creutzfeldt-Jakobovy nemoci)
- ✓ transfuze – podání transfuzního přípravku v zahraničí před rokem 1996
- ✓ léčba přípravky lidského původu např. pro růstové a vývojové poruchy (lidský růstový hormon)
- ✓ transplantace s použitím štěpu zvířecího původu, transplantace s použitím tkáně nebo buněk lidského původu v případě tvrdé pleny mozkové, ušního bubínku nebo rohovkového štěpu
- ✓ užívání injekčních drog, steroidů nebo hormonů, nepředepsaných lékařem (i v minulosti)

Máte právo klást otázky, týkající se odběru, a právo kdykoliv od odběru ustoupit.

V případě pochybností se poradte s lékařem transfuzního oddělení nebo přistupte k samovyloučení.

SAMOVYLOUČENÍ

Pokud si uvědomíte, že by Vaše krev mohla ohrozit příjemce transfuze, prosíme, od odběru odstupte nebo o této skutečnosti informujte pracovníky transfuzního oddělení či odběrového střediska.

DALŠÍ RIZIKA

Příjemce transfuze může být ohrožen i některými **léky**, které dárce užívá nebo užíval. Dlouhodobě jsou z dárcovství vyřazeni lidé, kteří užívají některé léky (tablety, injekce) na léčbu akné, lupénky, vypadávání vlasů, zbytnění prostaty apod. - **isotretinoin** (např. Aknenormin), **etretinat** (např. Tegison, Tigason), **acitretin** (např. Neotigason), **finasterid** (např. Adafin, Androfin, Finard, Finex, Gegen, Milten, Penester), **dutasterid** (např. Avodart, Dustar, Dutalan). Délka vyřazení dárce závisí na léku a na způsobu podávání.

Riziko přenosu infekce zvyšuje **pobyt v některých zemích**. Za rizikový se považuje dlouhodobý pobyt v tropických zemích, v zemích s výskytem malárie, Chagasovy choroby nebo horečky Q, pobyt v zemích se zvýšeným výskytem infekčních nemocí (např. infekční žloutenky, aj.)



VYŠETŘENÍ ODEBRANÉ KRVE

Kromě vyplnění předodběrového dotazníku, laboratorní kontroly a vyšetření zdravotnickým pracovníkem (pohovor) vyšetřujeme každou krev (plazmu, krvní destičky), odebranou k výrobě transfuzních přípravků, na přítomnost známků infekce:

- HBV (žloutenka B)
- HCV (žloutenka C)
- HIV (původce AIDS)
- syfilis (lues, příjice)

I přes uvedený způsob vyšetření nejsme schopni zaručit příjemci krve naprostou bezpečnost (např. proto, že test může být založen na průkazu protilátek a dárce může „trvat“ několik týdnů, než protilátku po „nakažení“ vytvoří). **Spolupráce s dárce a naprostá důvěra má tedy zásadní význam.** V případě nevyhovujících výsledků laboratorních vyšetření budete informováni. Průkaz infekce dárce HIV, HBV, HCV, nebo jiných závažných krví přenosných infekcí jsou důvodem vyloučení dárce z dalšího dárcovství.

Údaje o zdravotním stavu dárce uchováváme v jeho dokumentaci a při zachování zásad lékařského tajemství poskytujeme část z nich do Národního registru transfuzní služby.

Vám odebraná krev a její složky budou použity pouze v případě, že budou vyhovovat požadavkům na jejich bezpečnost a jakost.

ZMĚNA ZDRAVOTNÍHO STAVU PO ODBĚRU

Pokud v období 7 dní po odběru došlo u vás k rozvoji infekční choroby, která by mohla ohrozit příjemce transfuze, informujte, prosíme, zařízení transfuzní služby.